

# Immunization Schedule

Birth - 18 years

Influenza vaccine is recommended annually starting at 6 months

Children and teens should stay up-to-date with COVID-19 vaccine

More info:  
[www.doh.wa.gov/you-and-your-family/immunization](http://www.doh.wa.gov/you-and-your-family/immunization)



<b>Birth</b> HepB *RSV	<b>12 months</b> MMR Varicella HepA PCV	<b>9-10 years</b> HPV (2 doses) between 9-12 years
<b>2 months</b> DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)	<b>15 months</b> DTaP Hib	<b>11-12 years</b> Tdap MenACWY
<b>4 months</b> DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)	<b>18-24 months</b> HepA	<b>16 years</b> MenACWY
<b>6 months</b> DTaP-IPV-Hib-HepB PCV (Flu and Covid shots start at 6 months)	<b>4 years</b> MMRV DTaP-IPV	<b>16-18 years</b> MenB (2 doses) Discuss with your provider

March 2024

**Vaccine Key:**

- DTaP:** Diphtheria, Tetanus, Pertussis (whooping cough)
- HepA:** Hepatitis A
- HepB:** Hepatitis B
- Hib:** Haemophilus influenzae type b
- HPV:** Human Papillomavirus
- IPV:** Inactivated Polio Virus
- MenACWY:** Meningococcal A, C, W, Y (meningitis)
- MenB:** Meningococcal B (meningitis)
- MMR:** Measles, Mumps and Rubella
- PCV:** Pneumococcal (pneumonia)
- Tdap:** Tetanus, Diphtheria, Pertussis (whooping cough)
- Varicella:** Chickenpox

**Combination Vaccines:**

- Vaxelis:** includes DTaP-IPV-Hib-HepB
- Pediarix:** includes DTaP-HepB-IPV
- Pentacel:** includes DTaP-IPV/Hib
- ProQuad MMRV:** includes Measles-Mumps-Rubella-Varicella
- Quadracel/Kinrix:** includes DTaP-IPV

**\*RSV immunization** (respiratory syncytial virus): 1 dose for infants younger than 8 months during the RSV season, depending on maternal RSV vaccination status

**Instructions for poster modification:**

Customize tiles and vaccine key to your clinic's preferred immunization schedule, choice of combination vaccines, 2 or 3 dose rotavirus vaccine, and Men B wording.  
 (Note: this example uses Vaxelis and 2 dose rotavirus)  
 Check for accuracy and compliance with CDC/ACIP schedule. This is your responsibility.  
 Update the poster creation date. Add your logo and change colors of font/tiles if you wish.

# Calendario de vacunación

Desde el nacimiento hasta los 18 años

La vacuna contra la influenza debe administrarse una vez al año a partir de los 6 meses

Los niños y adolescentes deben estar al día con la vacuna contra el COVID-19

Obtenga más información en <https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family/inmunizacion> (disponible en español)



<p><b>Nacimiento</b></p> <p>HepB *VRS</p>	<p><b>12 meses</b></p> <p>MMR Varicela Hib</p>	<p><b>Entre los 9 y 10 años</b></p> <p>VPH (2 dosis) entre los 9 y 12 años</p>
<p><b>2 meses</b></p> <p>DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)</p>	<p><b>15 meses</b></p> <p>PCV DTaP HepA</p>	<p><b>Entre los 11 y 12 años</b></p> <p>Tdap MenACWY</p>
<p><b>4 meses</b></p> <p>DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)</p>	<p><b>24 meses</b></p> <p>HepA</p>	<p><b>16 años</b></p> <p>MenACWY</p>
<p><b>6 meses</b></p> <p>DTaP-IPV-Hib-HepB PCV (las vacunas contra la influenza y el Covid comienzan a los 6 meses)</p>	<p><b>4 años</b></p> <p>MMRV DTaP-IPV</p>	<p><b>Entre los 16 y 18 años</b></p> <p>MenB (2 dosis) Hable con su proveedor</p>

Actualizado en marzo de 2024

## Referencias de las vacunas:

- DTaP:** Difteria, tétanos y pertusis (tos ferina)
- HepA:** Hepatitis A
- HepB:** Hepatitis B
- Hib:** Haemophilus influenzae tipo b
- VPH:** Virus del papiloma humano
- IPV:** Vacuna inactivada contra la poliomielitis
- MenACWY:** Meningococo tipo A, C, W, Y (meningitis)
- MenB:** Meningococo tipo B (meningitis)
- MMR:** Sarampión, paperas y rubéola
- PCV:** Enfermedad neumocócica (neumonía)
- Tdap:** Tétanos, difteria y pertusis (tos ferina)
- Varicela:** Varicela

## Vacunas combinadas:

- Vaxelis:** Vacuna combinada que incluye DTaP-IPV-Hib-HepB
- Pediarix:** Vacuna combinada que incluye DTaP-HepB-IPV
- Pentacel:** Vacuna combinada que incluye DTaP-IPV/Hib
- ProQuad MMRV:** Vacuna combinada que incluye sarampión, paperas, rubéola y varicela
- Quadracel/Kinrix:** Vacuna combinada que incluye DTaP-IPV

**\*Inmunización contra el VRS** (virus respiratorio sincitial): 1 dosis para bebés menores de 8 meses durante la temporada del VRS, dependiendo del estado de vacunación materna contra el VRS

### Instructions for poster modification:

Customize tiles and vaccine key to your clinic's preferred immunization schedule, choice of combination vaccines, 2 or 3 dose rotavirus vaccine, and Men B wording. Note: this example uses Vaxelis and 2 dose rotavirus. Check for accuracy and compliance with CDC/ACIP schedule. This is your responsibility. Update the poster creation date. Add your logo and change colors of font/tiles if you wish.